

入学年度	学部	学科	組	番号	検	フリガナ
						氏名

● 合成関数の微分公式 (連鎖律)

2つの微分可能な関数  $y = f(u)$  と  $u = g(x)$  の合成関数  $y = f(g(x))$  の導関数を  $y = f(u)$ ,  $u = g(x)$  の導関数で表したい。いま、

$x$  の増分  $\Delta x$  に対する  $u$  の増分を  $\Delta u$ ,

$u$  の増分  $\Delta u$  に対する  $y$  の増分を  $\Delta y$

とする。すなわち、

$$\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x),$$

$$\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u)$$

と定義する。ここで、求めたいのは  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  の  $\Delta x \rightarrow 0$ としたときの極限である。 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  は少々無理矢理  $\Delta u$  を間に挟むと、

$$(*) \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

と書ける。この両辺の  $\Delta x \rightarrow 0$ とした極限を考える。ここで  $u = g(x)$  が微分可能な関数であることから、 $\Delta x \rightarrow 0$ のとき  $\Delta u \rightarrow 0$ となるので、

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \\ &= \boxed{\phantom{0}} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \end{aligned}$$

が成り立つ。これより、合成関数の微分公式の一つの形である次の式が得られる。

$$\frac{dy}{dx} = \boxed{\phantom{0}} \cdot \boxed{\phantom{0}}$$

合成関数の微分公式を、'を用いた記法で表すことを考えよう。合成関数  $f(g(x))$  の導関数  $(f(g(x)))'$  は

$$(f(g(x)))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x + \Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x}$$

で定義される。ここで、 $u = g(x)$ としたとき、 $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$ であったから、

$$g(x + \Delta x) = u + \Delta u$$

と書ける。したがって、 $g(x + \Delta x)$ ,  $g(x)$ をそれぞれ、 $u + \Delta u$ ,  $u$ で置き換えて

$$f(g(x + \Delta x)) - f(g(x)) = \boxed{\phantom{0}}$$

と書くことができる。そして、(\*)と同様に  $\Delta u$ を間に挟むことにより

$$\begin{aligned} \frac{f(g(x + \Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x} &= \frac{f(u + \Delta u) - f(u)}{\Delta x} \\ &= \frac{f(u + \Delta u) - f(u)}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \\ &= \frac{f(u + \Delta u) - f(u)}{\Delta u} \cdot \boxed{\phantom{0}} \end{aligned}$$

となる。この両辺において  $\Delta x \rightarrow 0$  すると、 $\Delta u \rightarrow 0$ だから、

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x + \Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{f(u + \Delta u) - f(u)}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x}$$

ここで、

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{f(u + \Delta u) - f(u)}{\Delta u} = \boxed{\phantom{0}}, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \boxed{\phantom{0}}$$

だから、

$$(f(g(x)))' = \boxed{\phantom{0}} \cdot \boxed{\phantom{0}}$$

$f'(u)$ を  $x$ で表すと  $f'(u) = f'(g(x))$ と書き直せるので、次の合成関数の微分公式が得られる。

$$(f(g(x)))' = \boxed{\phantom{0}}$$

● 逆関数の微分公式

関数  $f(x)$  の逆関数  $f^{-1}(x)$  の微分公式を導きたい。関数  $f(x)$  の逆関数とは、 $g(f(x)) = f(g(x)) = x$ をみたす関数  $g(x)$ に他ならない。そこで、 $f(g(x)) = x$ の両辺を合成関数の微分法を用いて微分すると、

$$\text{左辺} = \boxed{\phantom{0}}, \quad \text{右辺} = (x)' = 1$$

となるから、

$$\boxed{\phantom{0}} = 1$$

これを  $g'(x)$ について解くと、

$$g'(x) = -\frac{1}{\boxed{\phantom{0}}}$$

$g(x)$ を  $f^{-1}(x)$ ,  $g'(x)$ を  $(f^{-1}(x))'$ と書き直すことにより、逆関数の導関数の公式が得られる。

$$(f^{-1}(x))' = -\frac{1}{\boxed{\phantom{0}}}$$

[1]  $\left( f(g(h(x))) \right)'$  を求めよ.

[2]  $(g(x)^2)'$  を求めよ.

[3]  $f(x) = x^2$ としたとき,  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ である. 逆関数の微分公式を用いて  $(\sqrt{x})'$  を求めよ.

[4] 前問と同様にして  $(\sqrt[3]{x})'$  を求めよ.

[5] 次の関数を変数  $x$  で微分せよ.

a)  $f(x) = (1 - 2x^2)^3$

$f'(x) =$

b)  $f(x) = \frac{1}{(4x + 3)^2}$

$f'(x) =$

c)  $f(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^3}$

$f'(x) =$

d)  $f(x) = \left( x^2 - \frac{1}{x} \right)^3$

$f'(x) =$

e)  $f(x) = x\sqrt{x+1}$

$f'(x) =$

f)  $f(x) = \sqrt{9-x^2}$

$f'(x) =$

g)  $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - x + 1}$

$f'(x) =$

h)  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$f'(x) =$